

Szőlővédelmi előrejelzés

Pannonhalmi borvidék

2017. május 13.

Fenológia

A Pannonhalmi borvidéken fajtától függően a fűrtmegnyúlás és virágzás előtti állapot jellemző. A nyáriás időjárásnak köszönhetően a szokásosnál sokkal gyorsabban fejlődik a szőlő.

Időjárási adatok (04.30 – 05.13.)

Győrúj-barát	04.30.	05.01.	05.02.	05.03.	05.04.	05.05.	05.06.	05.07.	05.08.	05.09.	05.10.	05.11.	05.12.
Csapadék (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,8	5,8	-	-
Hőmérséklet (°C)	23	19	22	21	21	20	17	18	17	18	19	19	20

Győr-szemere	04.30.	05.01.	05.02.	05.03.	05.04.	05.05.	05.06.	05.07.	05.08.	05.09.	05.10.	05.11.	05.12.
Csapadék (mm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hőmérséklet (°C)	23	19	22	21	21	20	18	18	17	18	19	19	20

Széldomb	04.30.	05.01.	05.02.	05.03.	05.04.	05.05.	05.06.	05.07.	05.08.	05.09.	05.10.	05.11.	05.12.
Csapadék (mm)	-	-	1,2	-	-	-	-	-	-	6,6	-	-	-
Hőmérséklet (°C)	23	20	21	21	21	20,5	18	19	17	18	19	20	21

Lisztharmat

Az időjárási adatok alapján a lisztharmat aszkospóra - szóródásának második hullámához a feltételek április 26-án teljesültek, így a lappangási idő leteltével (20°C –os napi átlaghőmérsékleten 7-8 nap) lehet az elsődleges tünetek megjelenésére számítani. A primér tünetek megjelentek, így indokolt felszívódó készítmények használata (ld. védekezés)!

Peronoszpóra

A peronoszpóra fertőzés megindulásának is kedvezett a 26-27-i csapadékmennyiség. Érdemes felszívódó készítményt használni, hogy megelőzzük a peronoszpóra tüneteinek kialakulását.

Szőlőmolyok

A meleg tavaszi időjárás nagyon kedvez a molyok repülésének, rajzásának, tojásrakásának. Az első nemzedék repülése még mindig tart.

Atkák

Főként illatos fajtákon jellemző a levélatka kártétele a borvidéken. Egyre nagyobb felületen találkozunk a nemezes gubacsatka kártételével.

Védekezés

A **lisztharmat** elsődleges tüneteinek megjelenésével indokolt a felszívódó készítmények használata (pl. Sercadis 0,15 l/ha, Luna Experience 0,3 l/ha, Kusabi 0,2 l/ha, Vivando 0,2 l/ha). Kontakt partnerként kén tartalmú szerek (Kumulus S, Cosavet DF, Thiovit jet, Necator Plus stb.) használata ajánlott (Sercadis mellett nem szükséges!). Nagyon fontos, hogy 25°C alatti hőmérsékleten, szélcsendes időben permetezzünk.

Peronoszpóra ellen használhatunk kontakt pl.ditianon (Delan 700 WG – 0,5 kg/ha), metiram (Polyram DF 2 kg/ha), mankoceb (Dithane M45) hatóanyagú készítményeket, a várható hűvös és csapadékos időjárás miatt megelőzésként felszívódó hatóanyagú növényvédő szereket (pl. Delan Pro 2 l/ha, Acrobat MZ WG 2 kg/ha, Cymbal 45 WG 0,25 kg/ha).

Horváth Edit
Növényorvos
+36703939320
horvaathedit@gmail.com