

Szőlővédelmi előrejelzés

Pannonhalmi borvidék

2017. május 27.

Fenofázis

A Pannonhalmi borvidéken fajtától függően a szőlő virágzás eleji, teljes virágzásban és bogyóképződés stádiumban van.

Időjárási adatok (05.14 – 05.26.)

Győrújbarát	05.14.	05.15.	05.16.	05.17.	05.18.	05.19.	05.20.	05.21.	05.22.	05.23.	05.24.	05.25.	05.26.
Csapadék (mm)	-	15,2	0,2	0,2	-	-	-	-	4,8	-	-	14,4	-
Hőmérséklet (°C)	18	13	13	15	17	17	17	19	20	21	21	17	21

Győr-szemere	05.14.	05.15.	05.16.	05.17.	05.18.	05.19.	05.20.	05.21.	05.22.	05.23.	05.24.	05.25.	05.26.
Csapadék (mm)	-	15,2	0,4	0,2	0,4	-	0,2	-	3	-	-	3,6	0,2
Hőmérséklet (°C)	17	13	13	15	17	17	17	19	20	21	21	17	20

Széldomb	05.14.	05.15.	05.16.	05.17.	05.18.	05.19.	05.20.	05.21.	05.22.	05.23.	05.24.	05.25.	05.26.
Csapadék (mm)	-	13,4	0,2	-	0,2	3,6	0,6	-	0,6	0,4	-	10,4	2,8
Hőmérséklet (°C)	16	13	13	16	18	17	18	19	19	20	21	17	21

Lisztharmat

Az utóbbi hetek időjárása inkább a peronoszpórának kedvező, de a lisztharmat is felszaporodhat. Fontos feladat a virágzás során a legérzékenyebb szervek, porzók, bibék védelme, lehetőleg felszívódó készítménnyel, mert a pártasapka lehullásával a virág ledobja magáról a kontakt készítményt. Mivel nagyon érzékenyek a virágok, a kén kijuttatásával vigyázzunk! Felszívódó hatóanyagok elegendő védelmet adnak, kerüljük a perzselés lehetőségét.

Peronoszpóra

Az utóbbi két hét csapadékos időjárása miatt május 19-én bekövetkezett a peronoszpóra fertőzése, a tünetek megjelenésére a napokban lehet számítani, ha nem alkalmaztunk felszívódó készítményt. A szemlék alkalmazásával (május 27-vel bezárólag) tünetet a feltérképezett területeken még nem találtam a Pannonhalmi borvidéken. Ha az időjárás továbbra is ilyen csapadékos, változékony lesz, a tünetek

megjelenésére számítanunk kell. Az érzékeny virágok védelme megköveteli a réztartalmú készítmények mellőzését, mivel ezek perzselést okozhatnak!

Szürkerothadás

Botrytis ellen megelőző jelleggel alkalmazható szürkepenész elleni hatóanyag.

Szőlőmolyok

Jelenleg az első nemzedék tojásrakása zajlik. Egy virágzaton találtam hernyószövedéket, de ott a rovarölős kezelés eredményes volt a kártevővel szemben.

Atkák

A nemezes gubacsatka kártételével továbbra is találkozunk, bár arányaiban egyre kisebb felületen.

Védekezés

A **lisztharmat** ellen indokolt a felszívódó készítmények használata (pl. Sercadis 0,15 l/ha, Luna Experience 0,3 l/ha, Kusabi 0,2 l/ha, Vivando 0,2 l/ha). Aki az előző permetezésnél Sercadist vagy Luna Experience-t juttatott ki, az most ne tegye, helyette más hatóanyagú készítményt (Domark, Vivando, Kusabi, Alcedo, Collis – szürkepenész ellen is -, Folicur solo, Topas 100 EC stb.) válasszon. Nagyon fontos, hogy 25°C alatti hőmérsékleten, szélcsendes időben permetezzünk.

Peronoszpóra ellen a hűvös és csapadékos időjárás miatt felszívódó hatóanyagú növényvédő szereket (pl. Delan Pro 2,5 l/ha, Orvego 0,8 l/ha, Talendo Extra 0,25 l/ha, Acrobat MZ WG 2 kg/ha, Cymbal 45 WG 0,25 kg/ha, Pergado F 2kg/ha, Ridomil Gold MZ 68 WG 2,5 kg/ha).

Horváth Edit
Növényorvos
+36703939320
horvaathedit@gmail.com